



ГРИПП ПТИЦ

Это остропротекающее вирусное, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц заболевание с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.



Администрация Киржачского муниципального района Владимирской области

В случае заболевания или гибели птиц, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание - в течение 24 часов извещать

Киржачскую районную станцию по борьбе с болезнями животных

по телефонам:
+7 (49237) 2-31-67
+7 (49237) 2-17-69

Единую дежурно-диспетчерскую службу Киржачского района по телефону - 112, или +7 (49237) 2-01-19

внимание

ГРИПП ПТИЦ





МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

- соблюдение режима хозяйства закрытого типа
- завоз инкубационного яйца и цыплят только из благополучных источников
- ввоз и вывоз птицы только при наличии ветеринарных сопроводительных документов



Высокопатогенный грипп птиц способен размножаться практически в любом органе птицы-хозяина.

Низкопатогенный обычно ограничивается дыхательными путями и желудочно-кишечным трактом.

Вирус может передаваться при прямом контакте с выделениями зараженных птиц, особенно через фекалии или при употреблении зараженных кормов и воды.

Переносчиками инфекции являются дикие птицы (водоплавающие – гуси, утки), которые практически не заболевают, однако имеют свойство мигрировать с места на место и тем самым переносить вирусы на большие расстояния.

Среди домашних птиц к гриппу восприимчивы куры, индюки, перепела. После заражения развиваются тяжелые клинические проявления заболевания и летальный исход. За несколько дней смертность может приблизиться к **100%**.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
У ОТДЕЛЬНОЙ ПТИЦЫ – 1-3 ДНЯ,
В СТАЕ – 14 ДНЕЙ.

В БОЛЬШОЙ СТАЕ БОЛЬНУЮ ПТИЦУ
МОЖНО НЕ ЗАМЕТИТЬ, УЧИТЫВАЯ
ОЖИДАЕМЫЙ ПРИВЫЧНЫЙ УРОВЕНЬ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИЛИ СМЕРТНОСТИ.

Необходимо соблюдать требования Ветеринарных правил, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 24.03.2021 № 158.



ПРИЗНАКИ ГРИППА ПТИЦ

- снижение яйценоскости
- дискоординация движений
- искривление шеи
- отсутствие реакции на внешние раздражители
- угнетенное состояние
- почернение гребня и сережек
- хриплое затрудненное дыхание
- подкожные геморрагии (кровоизлияния) на конечностях



Грипп птиц может передаваться от птицы к человеку при условиях высокой концентрации.

! ОТ ЧЕЛОВЕКА
К ЧЕЛОВЕКУ
НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ

